



ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ



ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸಲಹಾ ಸೂಚಕ
(ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ,
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ-576213, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಸಾರ)

ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿ 05.09.2025 ರಿಂದ 09.09.2026

ಸಂ. ಗ್ರಾ.ಕೃ.ಹ.ಸೇ.ಬ/67/2026

ದಿನಾಂಕ: 04.09.2026

ಕೆಳದಿ ವಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ದಿನಾಂಕ: 31.08.2026 ರಿಂದ 04.09.2026 ರವರೆಗೆ)

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ದಿನ-1 (31.08.2026)	ದಿನ-2 (01.09.2026)	ದಿನ-3 (02.09.2026)	ದಿನ-4 (03.09.2026)	ದಿನ-5 (04.09.2026)
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ.)	-	12.2	6.3	0.1	3.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	-	30.5	30.3	30.6	30.7
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡಿ.ಸೆ.)	-	24.5	24.4	23.8	25.3
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಡಗಳ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಕಾ)	-	7	6	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ರ್ವತೆ (ಶೇ.)	-	91	87	86	90
ಕನಿಷ್ಠ ಆದ್ರ್ವತೆ (ಶೇ.)	-	76	75	83	83
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ./ಗಂಟೆಗೆ)	-	0	0	0	0

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳು ದಿನಾಂಕ

05.09.2026 ರಿಂದ 09.09.2026 ರ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು	ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ				
	ದಿನ-1 (05.09.2026)	ದಿನ-2 (06.09.2026)	ದಿನ-3 (07.09.2026)	ದಿನ-4 (08.09.2026)	ದಿನ-5 (09.09.2026)
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)	6	5	5	4	7
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	30	30	30	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°C)	24	24	23	24	24
ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ (ಒಕ್ಕಾ)	4	4	3	4	4
ಗರಿಷ್ಠ ಆದ್ರ್ವತೆ (ಶೇ.)	85	88	87	85	85
ಕನಿಷ್ಠ ಆದ್ರ್ವತೆ (ಶೇ.)	70	65	64	65	65
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (Kmph)	5	4	5	4	5
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (°)	254	360	81	81	360

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ವಿಸ್ತೃತ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 10.09.2026 ರಿಂದ 16.09.2026 ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಲಘು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 30.0 °C -30.0°C ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 22.0 °C -23.0°C ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದ್ರ್ವತೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 85% ರಿಂದ 88% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 64% ರಿಂದ 70% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು 04-05 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ರೈತರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Mobile Applications developed by India Meteorological Department for the benefit of Farming Community Farmers are suggested to download the app using below links

	Mausam:	Meghdoot:	Damini:
Andriod:	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
Apple OS:	https://apps.apple.com/us/app/id1522893967	https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155	https://apps.apple.com/app/id1502385645

Decadal Rainfall (mm) Comparison:

Year	30 years Mean	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rainfall	3783.8	2816.3	2383.4	2827.1	3000	3381.2	4118.4	4110.8	4110.8	3879.9	3456.2	4511.1	5425.0
Rainy days	108	112	107	119	121	112	123	126	152	125	110	137	142

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks
(IC – 26th August, 2026) (28th August to 10th September, 2026)



Date of Issue: September 4, 2026

Day 1: September 4, 2026	No warning
Day 2: September 5, 2026	No warning
Day 3: September 6, 2026	No warning
Day 4: September 7, 2026	No warning
Day 5: September 8, 2026	No warning
Day 6: September 9, 2026	No warning
Day 7: September 10, 2026	No warning

ರೈತರು ತೋಟ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ

ರೈತರು ಭತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು

ರೈತರು ಅಡಿಗೆಗೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಿಡುವಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಧಾರಿಸಿ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು

ಬೆಳೆ/ಉಪಕರಣ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ	ಬೆಳೆ ಸಲಹೆ
ಭತ್ತ	ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತ	ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ	ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದೆಯ ಬದುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳೆಯ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
		ಕೊಳವೆ ಹುಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳುವಿನ ಭಾಧೆ ಸಾಧ್ಯತೆ	- ಗದ್ದೆಯ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ - ಕೊಳವೆ ಹುಳುವಿನ ಭಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಾನ್‌ಟ್ರಿನೋಫ್‌ಫೋಲ್ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ 2.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 3.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ - ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳುವಿನ ಭಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಾನ್‌ಟ್ರಿನೋಫ್‌ಫೋಲ್ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ 2.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 3.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
		- ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ: - ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 25-30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 50-55 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀಡುವ ಸೂಕ್ತ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು/ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು - ಆಯ್ಕೆ 1: 40 ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ+26.10 ಕೆ.ಜಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ.+ 50.00 ಕೆ.ಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ - ಆಯ್ಕೆ 2: 52.5 ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ+75 ಕೆ.ಜಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ+ 50.00 ಕೆ.ಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ - ಆಯ್ಕೆ 3: 60.0 ಕೆ.ಜಿ 20:20:00:13+26.10 ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ+ 50.00 ಕೆ.ಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ - ಆಯ್ಕೆ 4: 80.0 ಕೆ.ಜಿ 15:15:15+26 ಕೆ.ಜಿ ಯೂರಿಯಾ+ 30.00 ಕೆ.ಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ	

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು

ಅಡಿಕೆ	ಕಾಯಿ ಆಗುವ ಹಂತ	ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ	ಸತತ ಮಳೆಚುಗಿತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಅಡಿಕೆಗೆ 1% ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಿಡುವಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು
-------	---------------------	--------------------------	---

		ಅಧಿಕವಾದ ತೇವಾಂಶ	ರೈತರು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
		ಸುಳಿ ತಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೋಮಿಡ್ ತಿಗಣೆಯ ಭಾಧೆ ಸಾಧ್ಯತೆ	ರೈತರು ಈ 02 ಹುಳುಗಳ ಭಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 1.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಥಯೋಮೆಥಾಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು 0.5ಗ್ರಾಂ/ನೀರಿಗೆ ಬರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
		ಬೇರು ಹುಳು ಭಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ	ಬೇರು ಹುಳು ಭಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ 3.0 – 5.0 ಮಿ.ಲೀ/ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಹಾಕುವುದು
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ: ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹೊಸ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಸರೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ತೋಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.	
ತೆಂಗು	ಕಾಯಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಹಂತ	ಅಧಿಕವಾದ ತೇವಾಂಶ	ರೈತರು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
		ರೈನೋಸೋರೆಸ್ ದುಂಬಿ ಭಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ	➤ ಹೊಂಡದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ (ಕೀಟಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ) ಜೀರುಂಡೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ ➤ ಕೀಟಗಳ ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಗೊಬ್ಬರದ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟೋಮೊಪಾಥೋಜೆನ್ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು (ಮೆಟಾರ್ಡಿಯಂ ಅನಿಸೊಪ್ಲಿಯಾ) ಸೇರಿಸುವುದು. ➤ ಪ್ರತಿ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದು. ➤ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಪೋರೇಟ್ 10ಲು+ಮರಳು (1:2) ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 150 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ➤ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರೇಟ್ 10ಲು. 5 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹಾಕಿ ಎರಡು ಒಳಗಿನ ಎಲೆಯ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಇರಿಸುವುದು ➤ ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ರೈನೋಲ್ಯೂರ್ ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
ಕಾಳು ಮೆಣಸು	ಕಾಳುಕಟ್ಟುವ ಹಂತ	ಅಧಿಕವಾದ ತೇವಾಂಶ	ರೈತರು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
		ಶೀಘ್ರ ಸೂರಗು ರೋಗ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರೋಗಭಾಧಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಈಜು) ವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ 1% ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು
ಗೇರು	ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮೊನೊಕ್ಲೋಟೋಫಾಸ್ 1.7ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂತ್ನಾಸ್ಟಾಟೋಫ್ರಿನ್ 0.5ಮಿ.ಲೀ/ಲೀ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.
		ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಭಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ	ರೈತರು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಭಾಧಿತ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ತದ ನಂತರ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಹರಳನ್ನು ಮರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿಸಿ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 5ಮಿ.ಲೀ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಿಸಿ ಭಾಧಿಸಿದ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು
ಮಲ್ಲಿಗೆ	ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ	ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು 1ಮಿ.ಲೀ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಸು	-----	ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶ	ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ
		ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ	ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ರೋಗ, ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ, ಹುಳು ಬೇನೆ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಚೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಸುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ 30-50ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು: ಈ ಜೀವಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೈತು ಹಾಕುವುದು ಇದರ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಾದ ಸೊಳ್ಳೆ, ತಿಗಣೆ, ನೋಣಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ	-----	-----	ಕರಾವಳಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಮೀನು ಕೊಳದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ರಸಸಾರವನ್ನು

			7.5 ಇರುವಂತೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು. ಅನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೀನಿನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೊಳದ ನೀರು ತಿಳಿ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮರಿಗಳು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕ	----	----	ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಘಟಕಗಳಾದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

(ಈ ಮೀನಿನ ಬೆಳೆ ಸಲಹೆಯು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ)

ಶ್ರೀ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ.ಎಮ್,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬಿ.ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್-ವಿಭಾಗ,
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕೇ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ.

ಡಾ. ಎನ್. ಇ. ನವೀನ್ ,
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬಿ.ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್-ವಿಭಾಗ,
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕೇ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ.