

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ಹಾಲು ನೀಡುವ ಹಸು        | 20-25 ಕೆ.ಜಿ./ದಿನ |
| ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸು | 25-30 ಕೆ.ಜಿ./ದಿನ |
| ಹಾಲು ನೀಡದ ಹಸು         | 15-20 ಕೆ.ಜಿ./ದಿನ |
| ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಸು           | 18-22 ಕೆ.ಜಿ./ದಿನ |
| ಕರುಗಳು (>6 ತಿಂಗಳು)    | 5-10 ಕೆ.ಜಿ./ದಿನ  |

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಮೇವು, ಸಾಂದ್ರ ಆಹಾರ, ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯೂಸಿನ್, ಮೇವಿನ ಅಂಶದ ಅಥವಾ ಸೈಲೋ ಮುಂತಾದ ದ್ವಿಧಳ ಮೇವುಗಳೊಂದಿಗೆ CoFS-31 ಅನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

#### ಸೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

CoFS-31 ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೈಲೇಜ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 60-70 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು 2-3 ಸಂ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೈಲೇಜ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 45 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಯನೈಡ್ (HCN) ವಿಷಜಾಧಿಯ ಅಪಾಯ ಇರಬಹುದು. ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ನೂರು ದಿನದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆನಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕಟಾವು ಆದ 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

#### ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

- ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬರದ ಬಳಿಕ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬಾರದು (HCN ವಿಷಜಾಧಿ ಅಪಾಯ).
- ಹೂ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಕೊಯ್ದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು.
- ಮೇವನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ದ್ವಿಧಳ ಮೇವು (ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯೂಸಿನ್, ಸೈಲೋ, ಅಂಶದ ಇತ್ಯಾದಿ) ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮತೋಲನ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

#### CoFS-31 ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಸಿರು ಮೇವು ಅಭ್ಯ.
- ಮೇವು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ.
- ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆ.
- ಸೈಲೇಜ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
- ಬಹುಕೋಯ್ತು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕೋಯ್ತುಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮೇವು ಬೆಳೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ  
ಭಾ.ಕೃ.ಅ.ಪ. - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, (ದ.ಕ.) ಕಂಕಣಡಿ, ಮಂಗಳೂರು-575002

# CoFS-31

## ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೇವಿನ ಜೋಳ

ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು,  
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

CoFS-31 ಜರ್ಮಿನ್‌ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ

CoFS-31 ಬೀಜ

ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ, ಭೂಮಿ ನಿರ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು  
ಭಾ.ಕೃ.ಅ.ಪ. - ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ  
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಎಣ್ಣೂರು  
ಕಂಕಣಡಿ ಅಂಚೆ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ-575002  
Email: kvkdkmhl@gmail.com, Web address: http://kvkdk.org

ಆಗಸ್ಟ್ - 2026

## CoFS-31 ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಮೇವಿನ ಜೋಳ:

### ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

ಡಾ. ಧರಣೀಶ್ ಎಸ್. ಕೆ. ಡಾ. ಟಿ. ಜಿ. ರಮೇಶ್, ಡಾ. ಹರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ,  
ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್. ಡಾ. ಕೇಧಾರನಾಥ, ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಆರ್. ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ರಾಹೋಡ್

ಬಿಸಿಎಆರ್-ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KVAFSU), ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಕಂಕನಾಡಿ.

ಮಂಗಳೂರು - 575 002

## ಪರಿಚಯ

CoFS-31 (Coimbatore Fodder Sorghum-31) ಒಂದು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬಹುಕೋಯ್ತು ಜೋಳದ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಳಿವುಳ್ಳದ್ದಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೋಯ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಕೋರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6-8 ಕೋಯ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮರುಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಸೈಲೇಜ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಳಸರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

## ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತಯಾರಿ

CoFS-31 ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಉಪಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 25-35°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು 600-1000 ಮಿ.ಮೀ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಲೋಮ ಹಾಗೂ ಮರಳು ಮಿಶ್ರತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದ, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಹರವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಹಾಗೂ pH 6.0-8.0 ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ 10-12 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

## ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ), ಹಿಂಗಾರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ CoFS-31 ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 10-12 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜೀವವನ್ನು ಕಾಬೆರ್‌ಡ್ರೈಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಥೈರಮ್‌ನಿಂದ ಜೀರ್ಣೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅಜೀರ್ಣಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೋರೈಸಿಯಾ ಬಳಸಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ (ಅಜೀರ್ಣಿಯಿಂದ - 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಜ, ಫಾಸ್ಫೋರೈಸಿಯಾ - 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಜ ಅಥವಾ ಥೈರಮ್/ಕಾಬೆರ್‌ಡಜಿಮ್ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆ.ಜಿ. ಬೀಜ).

## ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತರ:

ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ - 30 ಸೆಂ.ಮೀ.  
ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ - 15 ಸೆಂ.ಮೀ.  
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಚೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 75 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕ, 50 ಕೆ.ಜಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹಾಗೂ 40 ಕೆ.ಜಿ. ಪೊಟಾಶ್ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೋಯ್ತಿನ ನಂತರ 40-50 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮರುಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

## ನೀರಾವರಿ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೋಯ್ತು

ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 7-10 ದಿನಗಳಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ 5-7 ದಿನಗಳಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ 20-25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 40-45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸದೃಶಕ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಕೋಯ್ತನ್ನು 60-70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 45 ದಿನಗಳಗೊಮ್ಮೆ ಕೋಯ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಯ್ತಿನ ವೇಳೆ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 8-10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇಗನೆ ಮರುಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು.

## ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯ

ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ CoFS-31 ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 140-180 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ 8-10% ಕಚ್ಚಾ ಪ್ರೋಟೀನ್, 20-25% ಒಣ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ನಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

| ವಿವರ                     | ಪ್ರಮಾಣ                          |
|--------------------------|---------------------------------|
| ಮೊದಲ ಕೋಯ್ತು              | 30-40 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್              |
| ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಯ್ತು  | 18-25 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್              |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು            | 140-180 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವು/ಹೆಕ್ಟೇರ್ |
| ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶ              | ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ                   |
| ಒಣ ಪದಾರ್ಥ (DM)           | 20-25%                          |
| ಕಚ್ಚಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ (CP)      | 8-10%                           |
| ಕಚ್ಚಾ ನಾರು (Crude Fibre) | 28-32%                          |
| TDN                      | 55-60%                          |
| ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ               | 0.30-0.45%                      |
| ಫಾಸ್ಫರಸ್                 | 0.20-0.30%                      |

## ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ

CoFS-31 ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಮೇವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ದ್ವಿಧಳ ಮೇವು (ಹೆಡ್ಡ್ ಲ್ಯೂಸರ್ನ್, ಅಲಸಂದ್, ಸೈಲೋ ಇತ್ಯಾದಿ), ಒಣ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಸಾಂದ್ರ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಮತೋಲನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. CoFS-31 ಅನ್ನು ಜೊರು ಮಾಡಿ ಇತರ ಮೇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮೇವು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಏಕೈಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು.

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CoFS-31 ಹಸಿರು ಮೇವು: | 20-25 ಕೆ.ಜಿ.                                                                   |
| ಒಣ ಮೇವು:            | 3-5 ಕೆ.ಜಿ.                                                                     |
| ಸಾಂದ್ರ ಆಹಾರ:        | ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (ಸುಮಾರು 1 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಂದ್ರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ 2.5-3 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು) |
| ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣ:        | 50 ಗ್ರಾಂ                                                                       |
| ಉಪ್ಪು:              | 30 ಗ್ರಾಂ                                                                       |
| ಶುದ್ಧ ನೀರು:         | ಬೇಕಾದಷ್ಟು                                                                      |